

NOTA SÔBRE ÁCAROS ASSOCIADOS A SAUVEIRO

CARLOS H. W. FLECHTMANN

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de São Paulo — Piracicaba

Peios dados que temos em mãos, parece-nos que a única referência a ácaros mirmecófilos e termitófilos no Brasil é de SELLNICK (1926).

De uma "esponja", retirada de um sauveiro de *Atta sexdens rubropilosa* (Hymenoptera, Formicidae) na região de Piracicaba e recentemente exterminado por formicida, e que nos foi trazida pelo Dr. F. A. M. MARICONI, recuperamos um certo número de ácaros.

O exame dêste material revelou as seguintes formas :

1. Ácaros do gênero *Gaiolaelaps* (Laelaptidae) . Trata-se de ácaros que são frequentemente encontrados em artrópodos.
2. Vários ácaros da família Uropodidae, provavelmente dos gêneros *Fuscuropoda* e *Prodinychus*. Trata-se de espécies consideradas micófagas.
3. Ácaros das famílias Belbidae, Oribatulidae e Lohmaniidae, que são ácaros de solo, e micófagos.

Nenhuma destas formas é citada por SELLNICK (1926). A identificação específica será publicada oportunamente.

LITERATURA CITADA

SELLNICK, M., 1926 — Alguns novos ácaros (Uropodidae) mirmecófilos e termitófilos. *Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro* 26. 29-59.