

NEMATÓIDE DO GÊNERO *HETERODERA* DANIFICA A FIGUEIRA

LUIZ GONZAGA E. LORDELLO, AILTON ROCHA MONTEIRO
& RUBENS R. A. LORDELLO

O Dr. Wallace Gonçalves, passando por Valinhos, coletou algumas raízes de figueira (*Ficus carica* L.) em condições de declínio.

Examinando o material, verificamos infestação por um nematóide do gênero *Heterodera* Schmidt, 1871, cujas espécies são alhures, conhecidas como "formadoras de cistos" (*cyst forming nematodes*).

Em sua "contribuição ao conhecimento dos nematóides do solo de algumas regiões do E de S. Paulo", LORDELLO (1953) informou a ocorrência de um nematóide do gênero em apreço, coligido na mesma região de Valinhos. A planta hospedeira foi duvidosamente referida como o pessegueiro. Este nematóide não foi jamais identificado ao nível de espécie, sendo possível tratar-se do mesmo ora coletado.

O material acha-se em estudo no Departamento de Zoologia da ESALQ, em Piracicaba, e no Instituto Agrônomo, em Campinas. Oportunamente, será publicado um trabalho sobre o assunto.

SUMMARY

Roots of fig trees sent in from Valinhos, State of S. Paulo, Brazil, were found attacked by a cyst forming nematode species (*Heterodera* sp.). Investigations on the subject are in progress.