

**UMA PSEUDOFILÍNEA NOVA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO**
(Orthoptera-Tettigoniidae)

S. de Toledo Piza Jr. (1)

Tetragonomera fluminensis sp.n.

♂ - Colore badia, nigro ornatus. Vertex convexus, fastigio profunde sulcato, apice obtuso, vix inciso. Oculi rotundati, prominentes. Antennae longissimae, castaneo-nigro anulatae, articulo primo dente apicali, modico, obtuso, scrobo antice nigro-nitido. Pronotum margine antico angulato, tuberculo conico, obtuso, prono, armato, metanotum fortiter ascendens, maxima parte nigrum, margine postico ad angulos laterales tuberculato et in medio fortiter dentato, antice, post sulcum posteriorem utrinque tuberculo conico valido praeditum, marginibus lateralibus horizontalibus in medio tuberculo obtuso instructis. Elytra versus apicem angustata, maculis numerosis nigro-nitidis conspersa. Alae dense cinerae, venis transversis dilutis. Femora omnia castaneo vel castaneo-nigro ornata, I subtus ad marginem internum spinis dentiformibus 3 armata, II spinis 7, III spinis complurimis Lamina subgenitalis a medio usque ad extremitatem subparallela, castanea, carinata, apice angulatim emarginata, stylis extus excavatis, latitudine laminae haud majoribus. Cerci validi, modice compressi, mucrone minimo armati.

♀ - Mari similis sed major, tuberculo mediano marginis antici pronoti apice diviso. Spinae femorum posticorum minus numerosae. Ovipositor validus, vix curvus, uniformis, nitidus. Lamina subgenitalis lata, parallela, profunde divisa, lobis valde divergentibus. Cerci curvi, teretes.

(1) Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», USP, Piracicaba.

	♂	♀
Longitudo corporis	32 mm	43 mm
Longitudo pronoti	6 mm	8 mm
Longitudo elytrorum	36 mm	48 mm
Longitudo fem. ant.	13 mm	16 mm
Longitudo fem. post.	26 mm	30 mm
Longitudo ovopositoris		20 mm

Pátria: Rio de Janeiro.

Col.: Greed & Guimarães, janeiro, 1965.

Tipos: 1 macho e 1 fêmea no Departamento de Zoologia da «Luiz de Queiroz».

Difere de *Tetragonomera marmorata* (Burm.) pelo tubérculo mediano do bordo anterior do pronoto conico, de apice não dividido (♂) ou apenas dividido (♀), élitros mais largos, asas mais escuras, com as veias transversais mais evidentes, espinhos inferiores dos fêmures III mais numerosos, pelos cercos comprimidos (♂), pelos estilos mais grossos e excavados (♂) e pela lâmina subgenital de lobos mais largos e mais abertos.