

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Eriolus* DO BRASIL (Orthoptera, Tettigoniidae, Copiphorinae)

S. de Toledo Piza Jr. (1)

Eriolus paruensis sp.n.

Gracilis, colore badia. Vertex vitta triangulari nigra, a margine antico pronoti usque ad apicem fastigii extensa, fastigio extremitatem articuli primi antennarum haud attingente. Oculi obscuri, rotundati, non multo prominentes. Frons genaeque modice convexae. Discus pronoti marginibus vix rotundatis, vitta nigra latissima, laxe puncturata, parte metazonali in medio dilutiore, ornatus, lobi deflexi vix divergentes, angulo antico ample rotundato, postico multo minus rotundato. Elytra longa, parallela, apice rotundato, quartam partem apicalem tibiaram posticarum attingentia, campo anali basi infabre reticulato, obscuro. Sterna inermia. Femora antica subtus margine antico 2-3 spinosa, lobis genicularibus obtusis. Femora intermedia spinis 3, lobis genicularibus spinosis, spina interna majore. Femora postica spinis 6-7 extus, 3 intus-armata, lobis genicularibus spina valida, acuta, recurva. Spinnae omnes nigrae. Ovipositor longus, rectus, angustus, versus apicem vix attenuatus, laevigatus, apice acuto. Lamina subgenitalis latissime U-incisa, lobis magnis, acutis.

Longitudo: corporis, 18 mm; pronoti, 6; elytrorum, 37; fem. ant., 8,5; fem. post., 18; ovipositoris, 19.

Pátria: Tiriós, Alto Parú d'Oeste, Pa.

Col.: Machado & Pereira, II-1963

Tipo: Uma fêmea, pertencente ao Museu de Zoologia da USP, presentemente na «Luiz de Queiroz».

Difere das espécies conhecidas pelo ovipositor longo e direito e pela faixa negra que recobre o vértice da cabeça, o fastigio e se continua pela parte mediana do disco do pronoto.

(1) Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», USP, Piracicaba.