

UM NOVO COIPHORIDEO DO BRASIL

(Orthoptera)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

Caulopsis emarginata sp. n.

Palida, parte apicali elytrorum indistincte virescenti, margine interna mandibularum et apice castaneo-nigris, oculis obscuris. Fastigium verticis conicum, crassum, apice obtusum haud carinulatum. Pronotum minutissime granulatum. Elytra extremitatem femorum posticorum valde superantia, apice fortiter emarginato-truncata. Femora 4 anteriora subtus inermia. Femora postica inferne spinis 7 extus, 3-4 intus. Segmentum abdominale dorsale ultimum in medio profunde fissum, lobis triangularibus acutissimis prominentibus deflexis. Cerci gracili, elongati, acuti, irsuti. Ovipositor rectus, apicem versus ampliatus, puncturatus, extremitatem elytrorum haud attingens.

Longitudo corporis	25 mm
Longitudo fastigii	2 mm
Longitudo pronoti	4 mm
Longitudo femorum anteriorum	4 mm
Longitudo femorum posticorum	13,8 mm
Longitudo ovipositoris	14 mm

Tipo : uma fêmea.

Pátria : Piracicaba, S. Paulo, Brasil.

Col. : A. Correa, 1946.

A presente espécie se distingue facilmente de todas as outras pelos élitros de ápice fortemente emarginado-truncado.